

	MC	CU
<b>SEDE DELLE LESIONI</b>		
Sedi più frequente	Ileo terminale e colon	Retto e colon (con inizio distale)
Sedi più rare	Ileo prossimale, digiuno, duodeno	<i>Backwash ileitis</i> (10%)
Interessamento del retto	Spesso indenne	90% dei casi
Lesioni ano-perineali	Frequenti	Rare

DISTRIBUZIONE DELLE LESIONI	Discontinua ( <i>patchy</i> )	Continua
-----------------------------	-------------------------------	----------

REPERTI ISTOLOGICI		
Infiammazione	Transparietale	Limitata a mucosa e sottomucosa
Granulomi	50-75% dei casi	Assenti
Fessure	Presenti	Rare
Ispessimento fibroso sottomucosa	Comune	Assente

REPERTI ENDOSCOPICI		
Lesioni della mucosa	Discontinue (nel colon)	Continue
Ulcere aftose	Frequenti	Rare
Ulcerazioni della mucosa	Longitudinali, a binario	Diffuse
Acciottolato	Presente	Assente
Mucosa friabile	Raramente	Abitualmente
Sanguinamento	Occasionale	Costante
Disegno vascolare	Normale	Alterato

ESAMI DI LABORATORIO		
Ipoproteinemia	Presente	Assente
Linfocitopenia	Presente	Assente
p-ANCA	Rari	Presenti

COMPLICAZIONI CLINICHE		
Occlusione intestinale	Presente	Assente
Perforazione	Presente	Assente
Ascessi, fistole	Presenti	Assenti
Complicazioni extraintestinali	Presenti	Rare